



Special

Tokra®

Fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva curativa e bloccante.

Composizione: Kresoxym metile 25%

+ Penconazolo 8,75%

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

CLP: H319 - H351 - H361d - H410

Registrazione: In corso di Registrazione

Flacone: 600 g

Cartone: 12x600 g

Pallet: 360 kg



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Miscela fungicida a base di due principi attivi con meccanismi di azione completamente differenti fra loro, in grado di offrire una forte sinergia di azione e nessun rischio di resistenza incrociata.
- ✓ Azione sistemica e di contatto, esplica una efficace protezione sia su tralci e foglie sviluppate e in via di sviluppo, nonché che sui grappoli.
- ✓ Agisce impedendo la germinazione delle spore, bloccando e devitalizzando il micelio fungino e impedendo la penetrazione del fungo entro foglie e grappoli.
- ✓ Formulato esclusivo Sapec Agro.

VANTAGGI

- ✓ Azione multisito, efficacia incrementale rispetto ai tradizionali formulati a base di Penconazolo.
- ✓ Formulazione in microgranuli idrodispersibili in grado di garantire una perfetta miscibilità, solubilità e assenza di polverosità.
- ✓ Efficace su Oidio e su Black Rot della vite, anche in presenza di condizioni fortemente predisponenti la malattia.
- ✓ Utilizzabile dalla fase di sviluppo dei tralci a inizio maturazione.

© Marchio registrato.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	MODALITA' APPLICATIVE
Vite	Oidio (<i>Uncinula necator</i>), Black rot (<i>Guignardia bidwellii</i>)	0,3-0,4 kg/ha	Intervenire preferibilmente in via preventiva fra inizio sviluppo vegetativo (4-5 foglie sviluppate) fino a inizio maturazione con trattamenti ogni 12-14 giorni. Sono effettuabili al massimo tre interventi all'anno.



Intervallo di sicurezza: 35 giorni.